

### 3. Über ein Sporozoon beim Pferde.

Von Dr. Max Flesch (Bern).

Gelegentlich der Herstellung eines Vorlesungspraeparates zur Demonstration des Darmepithels beim Pferde fand ich im Bindege-  
webe der Darmzotten kugelige und ellipsoide Körper, von etwa  $80\mu$  (gemessen  $63\mu$  kleinster,  $89\mu$  größter) Durchmesser, welche nach der Örtlichkeit wie nach ihrer Form als parasitäre Bildungen aufge-  
faßt werden mußten. Sie bestanden aus einer Kapsel und deren In-  
halt; letzterer setzte sich aus zweierlei Substanzen zusammen: einem  
körnigen, durch Carmin und Haematoxylin tingirbaren Körper, welcher  
von der Hauptmasse des Inhaltes deutlich abgegrenzt ist; ferner der  
den größten Theil des Raumes erfüllenden Hauptmasse, bestehend  
aus zahlreichen größeren und kleineren Kugeln von stark lichtbre-  
chender Beschaffenheit, welche in eine, der Färbung widerstehende  
körnige Materie eingelagert sind. Die Häufigkeit dieser Gebilde war  
eine beträchtliche. Trotz des Verlustes vieler Schnitte konnten aus  
einem etwa 5mm langen, 7—8mm breiten Stückchen des Materiales  
— welches allerdings wegen der Faltung der Schleimhaut durch Con-  
traction der Muskelschicht wohl 1cm der frischen Schleimhaut ent-  
sprach, an 40 Praeparate gewonnen werden, welche ein oder mehrere  
— bis 4 Exemplare des Parasiten enthielten. Zuweilen lagen zwei  
Thiere in einer Zotte; meist fanden sie sich näher dem freien Ende  
derselben. Wiederholt war eine zellige Anhäufung in Umgebung der  
Kapsel, wohl als Beginn einer bindegewebigen Neubildung zu sehen.

Einzelne Praeparate zeigten Abweichungen von der vorstehenden  
Beschreibung, welche vermuthlich auf Entwicklungsvorgänge zurück-  
zuführen sind. Folgende Formen wurden gefunden: 1) Eine dünne  
Kapsel von etwa der gleichen Größe, wie die der geschilderten Körper,  
umschließt einen feinkörnigen, in seiner Gesamtheit sich durch Car-  
min — wenn auch anscheinend etwas weniger intensiv als der kern-  
artige Körper der typischen Gebilde — färbenden Inhalt; 2) den In-  
halt einer (dicken) Kapsel bildet eine, dem Volum nach bedeutendere,  
ungefärbte und eine der ersteren kappenartig aufsitzende, sich inten-  
siv färbende Masse; es fehlen die vacuolenartigen Kugeln; 3) die  
Kapsel umschließt nur einen schwach gefärbten, der glänzenden  
Kugeln entbehrenden, ungleichmäßig granulirten Inhalt; es findet sich  
aber in ihrer Wand eine nischenartige Höhle, welche anscheinend sich  
durch eine micropystenartige Lücke der Wand nach außen öffnet. Von  
diesen verschiedenen Formen habe ich allerdings 1 und 3 bisher nur  
in einem, 2 in 2 Praeparaten gefunden. Vorläufig wäre es also kaum  
mehr als Hypothese, wenn man versuchen wollte, einen Zusammen-

hang zwischen den beschriebenen Formen etwa in der Weise zu suchen, daß sich aus der Zellmasse (1) eine Kernmasse oder Restkörper von dem eigentlichen Zellkörper differenzire (2), daß dann in letzterem sich die lichtbrechenden Körper (Fettkugeln? es gelang bisher weder Schwärzung in Osmiumsäure noch Auflösen in Alcohol und Äther) differenziren, wonach eine Abschließung des Restkörpers und vielleicht dessen Austritt durch die micropylenartige Öffnung (3) erfolgte.

Zur Vervollständigung des Thatsächlichen ist noch hinzuzufügen, daß das Material einer frisch getödteten Stute etwa 1 Stunde nach dem Tode entnommen wurde. Von anderen Parasiten wurde noch *Taenia mamillana* in 12 Exemplaren gefunden. Das Material wurde in Müller'scher Flüssigkeit erhärtet. Ob dem Parasiten eine praktische Bedeutung zukommt, muß dahingestellt bleiben; bei der Massenhaftigkeit seines Vorkommens — falls dasselbe in größeren Darmstücken ebenso festgestellt wird, wie in dem untersuchten Stückchen — erscheint dies nicht unmöglich.

Herr Professor Leuckart hatte die Güte, nach Ansicht eines Praeparates seine Zustimmung zur Auffassung des Parasiten als eines Sporozoon auszusprechen; auf meinen Wunsch hat derselbe, da ihm die Bezeichnung als *Coccidium* unstatthaft erschien, den Gattungsnamen *Globidium* vorgeschlagen; es möge mir erlaubt sein, das Thier als *Globidium Leuckarti* zu benennen.

Indem ich mir vorbehalte, nach Verarbeitung des noch in meinem Besitz befindlichen Materiales eine ausführliche Darstellung und Abbildungen zu publiciren, bin ich schon jetzt gern bereit, so weit meine Praeparate reichen, Collegen, welche sich für den Fund interessiren, solche zu übersenden.

Bern, den 3. Mai 1883.

#### 4. Intorno a due nuovi pesci dal golfo di Napoli.

Nota del Dr. Enrico Hillyer Giglioli,

Prof. ord. di Zoologia e Anat. Comp. degli Animali Vertebrati nel R. Istituto di Studi Superiori, Firenze.

Si ritiene generalmente che la Ittiofauna del Mediterraneo sia ben nota, ma ciò è lungi dall' essere vero; molte forme comuni sono mal note e di tratto in tratto capita fuori qualche novità. Da non molto tempo io ebbi dal solerte e altamente benemerito professore Anton Dohrn, il quale coll' impianto della sua »Stazione Zoologica« ha davvero inaugurato un' Era novella per le ricerche biologiche nello splendido Golfo Partenopeo, due pesciolini che a prima vista mi erano sconosciuti e che studiati poi risultarono essere nuovi per la scienza;